

ZERKLEINERER BEI DER ARBEIT

Insekten in Kuhfladen auf Weiden in drei Bewirtschaftungsformen in den Niederlanden, durchschnittliche Anzahl Tiere, gerundet*

Zweiflügler


- Schwingfliegen (*Sepsidae*)
- Echte Fliegen (*Muscidae*)
- Fenstermücken (*Anisopodidae*)
- Dungfliegen (*Scathophagidae*)

- Waffenfliegen (*Stratiomyidae*)
- Schmetterlingsmücken (*Psychodidae*)
- Schwebfliegen (*Syrphidae*)


Käfer

- Wasserkäfer (*Hydrophilidae*)
- Blatthornkäfer (*Scarabaeidae*)
- Kurzflügler (*Staphylinidae*)
- Stutzkäfer (*Histeridae*)


- Larven
- erwachsene Tiere
- ◻◻ unter 0,5 Exemplare



102 konventionelle Bewirtschaftung



156 ökologische Bewirtschaftung



168 Naturschutzgebiet

* 12 Kuhfladen, 10 Tage alt, von ähnlichen Kühen aus 8 konventionellen und 6 ökologischen Höfen sowie 6 Naturschutzgebieten mit ähnlichen Böden, alle innerhalb von 200 Quadratkilometern